

医療機関使用欄

ヤーズ®配合錠服用開始日

年 月 日

ヤーズ®配合錠に関するお問い合わせ  
バイエル薬品株式会社 くすり相談

ヤーズ専用ダイヤル: **0120-113-225**

受付時間: 365日24時間

RMP

(201701)YAZ-30.0(10/オビ)(DI/DI)  
L.JP.MKT.WH.10.2017.1147

資材記号 **YAZ170704**

患者携帯カード

月経困難症治療薬

ヤーズ®配合錠を服用している方へ

- ヤーズ®配合錠を服用すると、**血栓症**(血管内に血のかたまりが詰まる病気)を  
発現する可能性があります。
- 血栓症の早期発見のためにも**定期的な診察**を受けてください。
- 次のような症状があらわれた場合は、**すぐに救急医療機関を受診**してください。

- 突然の足の痛み・腫れ
- 手足の脱力・まひ
- 突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み
- 激しい頭痛、舌のもつれ・しゃべりにくい
- 突然の視力障害(見えにくいところがある、視野が狭くなる) など

他の診療科、医療機関を受診する際には、  
このカードを必ず提示してください。

- 次のような症状があらわれた場合は、血栓症の疑いがあります。症状が軽くても飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。

足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり、頭痛、嘔吐(おうと)・吐き気 など

- 次のような状態になった場合、飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。

体を動かさない、脱水 など

長時間同じ姿勢でいたり、水分が不足したりすると血栓症が起こりやすくなります。適度に体を動かしたり、こまめに水分をとるようにしましょう。

- この患者さんはヤーズ® 配合錠(卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤)を服用しています。
- 患者さんが本カードの赤枠内に記載されている症状を訴えて受診した場合には、卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤に関連した**血栓症※の可能性を念頭においた診察をお願いします。**

※主に下肢静脈血栓症、肺血栓塞栓症、まれに頭蓋内静脈洞血栓症、脳梗塞、腸間膜血栓症、網膜血栓症、心筋梗塞等

- 異常な症状があれば必要に応じて処方医にご相談ください。