

致特居乐 (Triquilar) 28首次使用者

- 1 请打开钱夹式包装盒，
撕开月历贴纸。

钱夹式包装盒 ▶



- 2 特居乐28片的首次服药从“月经周期第一天”开始。

- 1 请撕下月历贴纸上左端为月经周期第一天所对应星期的那张贴纸，
如下图照片所示粘贴于药片铝塑板上。请扔掉剩余月历贴纸。




- 2 按照月历贴纸与药片板上的箭头方向，
从棕色药片开始服药，每天1片连服28天，
每天约同一时间服药。
通常服用最下面一排的药片（略大的白色药片）期间，
会出现类似月经的出血。



- 3 无论出血停止或持续，在28片全部服完后，继续开始服用新一板药片。

- 4 连续服用特居乐28片时，由于每次开始服用新一板药片的星期均相同，请粘贴与①相同的月历贴纸。

【例】月经在1月6日（星期四）开始时




请每天约同一时间
(例如就寝前) 服药

特居乐28片服药期间的注意事项

- 飲み忘れたとき (やや大きい白色錠剤を除く※)

【例】毎日21時(午後9時)に飲んでいるとき

- 1日飲み忘れて、次の日の服用時刻までに気づいたとき



- 1日飲み忘れて、次の日の服用時刻に気づいたとき



- 2日以上連続して飲み忘れたとき



※やや大きい白色錠剤を飲み忘れたときは、飲み忘れた錠剤を飲んだものとみなし、
飲み忘れた錠剤は飲まずに、気づいたときから通常通り飲みます。

- 服用を開始して1~2周期は、
下記の症状が現れることがあります。

- 軽度の吐き気 ● 乳房の張り ● 周期の途中の軽度の出血
- これらの症状は、いずれも通常は服用中に消失しますが、心配な場合や、その他にも身体に何か異常を感じたときは、医師または薬剤師に相談・報告してください。

- 次のような症状があらわれた場合には飲むのをやめて
すぐに救急医療機関を受診してください。

- 手足 …… 足の突然の痛み・腫れ、脱力・まひ
- 胸 …… 突然の息切れ、押しつぶされるような痛み
- 頭 …… 激しい頭痛 ● □ …… 舌のもつれ・しゃべりにくい
- 目 …… 突然の視力障害
- など

- 次のような場合には、症状が軽くても
飲むのをやめてただちに受診してください。

- 血栓症が疑われる症状があらわれた場合
足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり、頭痛、吐き気・嘔吐 など
- 体が動かせない状態になった場合、著しく血圧が上がった場合、
脱水の状態になった場合など

- 以下のときは、医師に相談・報告してください。

- 一番下の段の錠剤 (やや大きい白色錠剤) 服用中に出血がこないとき
- 激しい下痢、または嘔吐が続くとき
- 他の薬や健康食品を服用・摂取するとき
- 臨床検査を受けるとき ● 妊娠を希望するとき
- その他、気になる症状があるとき