致特居樂（Triquilar）28片初次使用者

1 請打開錢夾式包裝盒，撕開月曆貼紙。

錢夾式包裝盒 ▶

2 特居樂28片**的首次服藥從「月經週期第一天」開始。**

1 請撕下月曆貼紙上左端為月經週期第一天所對應星期的那條貼紙，如下圖照片所示粘貼於藥片鋁塑板上。請扔掉剩餘月曆貼紙。

【例】月經在星期四開始時

2 按照月曆貼紙與藥片板上的箭頭方向，從棕色藥片開始服藥，每天1片連服28天，每天約同一時間服藥。
通常服用最下面一排的藥片（略大的白色藥片）期間，會出現類似月經的出血。

3 無論出血停止或持續，**在28片全部服完後，繼續開始服用新一板藥片。**

4 連續服用特居樂28片時，由於每次開始服用新一板藥片的星期均相同，請依照步驟一的指示黏貼月曆貼紙。

【例】月經在1月6日（星期四） 開始時



請每天約同一時間（例如就寢前）服藥

特居樂28片服藥期間的注意事項

漏服時（略大的白色藥片除外※）

【例】每天21點（晚上9點）服藥時

●漏服1天，在次日服藥時間之前發覺時



●漏服1天，在次日服藥時間發覺時

●漏服連續超過2天時

停止服藥，使用其他避孕方式。
從下一個月經週期第一天開始服用新一板藥片。

※漏服了略大的白色藥片時，就當作該漏服藥片已經服用，不必補服，從當您發覺時開始照常服用。

開始服藥的1～2週期，有時會出現以下症狀。

●輕度惡心　●乳房脹痛　●週期中出現輕度出血

這些症狀通常均在服藥期間消失，若擔心或者您感覺身體有任何不適，請諮詢醫師或藥劑師。

出現下述症狀時，請停止服藥並立即前往急救中心就診。

●手腳…腳部突發性疼痛、腫脹，四肢無力、麻痺
●胸部…突發性氣喘、擠壓疼痛
●頭…劇烈頭痛
●口…舌頭打結、言語困難
●眼…突發性視力障礙
等

出現下述情況時，即使症狀較輕也請停止服藥，立即就診。

●出現疑似血栓的症狀時
腳部疼痛、腫脹、麻木、皮膚發紅、燒灼感，頭痛，惡心、嘔吐等
●出現身體無法動彈、血壓明顯升高、脫水症狀等情況時

如遇下述情況請諮詢醫師。

●服用最下面一排藥片（略大的白色藥片）期間未出現出血時
●持續劇烈腹瀉，或者嘔吐時
●服用其他藥物或保健食品時
●接受臨床檢查時
●準備懷孕時
●出現其他擔心的症狀時

Bayer Yakuhin, Ltd.
Approval Number: L.JP.MKT.WH.03.2016.0545